



## پارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

| عوارض و مراقبت های پرستاری   | دسته دارویی و کاربرد  | دوز دارو و نحوه استفاده  | نام دارو  |
|--|---|--|---|
| <p>عوارض : گرگرفتگی صورت ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه ، احساس طعم فلز در دهان ، افزایش تعریق ، احساس ناراحتی در دست ها ، فشار و ناراحتی قفسه سینه ، درد گردن ، هایپرونتیلیسیون ( تنفس زیاد و سریع )</p> <p>لازم است عوارض جانبی شایع آدنوزین مثل فلاشینگ، تنگی نفس و احساس فشار بر قفسه سینه به بیمار توضیح داده شود</p> <p>در زمان دریافت دارو بیمار حتما باید مانیتور باشد و هرگونه آریتمی فوراً گزارش گردد</p> | <p>ضد آریتمی (تبدیل PSVT به ریتم سینوسی )</p> <p>سرعت هدایت گره AV قلب را کم کرده، با مسیره های فرعی ورودی به گره AV مقابله می کند و منجر به بازبایی ریتم نرمال سینوسی می شود ، درمان Reentry SVT که به تحریک واک جواب نمی دهد و تاکی کاردی با QRS باریک و حتی بهن در صورتی که منظم باشد از اندیکاسیون های این دارو می باشد</p> | <p>6mgr per 2mil</p> <p>دوز اولیه در بالغین بصورت تزریق سریع وریدی (IV PUSH) 6mgr طی مدت یک تا دو ثانیه می باشد</p> <p>در صورت عدم اصلاح آریتمی ، یک تا دو دقیقه بعد 12mgr دیگر داده می شود ، در صورت لزوم ممکن است این ۱۲ میلی گرم ، یک بار دیگر تکرار شود</p> <p>از دوزهای بالاتر از 12mgr بصورت منفرد اجتناب گردد</p> |  <p><b>آدنوزین</b><br/>Adenosine</p> |

- (۱) در صورت امکان، تزریق دوز بولوس باید از طریق نزدیکترین ورودی به قلب بیمار انجام شود، به منظور اطمینان از وارد شدن فرآورده به جریان سیستمیک، تجویز هر دوز بولوس با فلاش سریع حدود ۲۰ سی سی مایع نرمال سایلین صورت گیرد.
- (۲) به دلیل احتمال تشکیل کریستال، فرآورده نباید در بخچال نگهداری شود و در صورت تشکیل کریستال باید به آرامی دمای محلول را به دمای محیط برسانید .

