



## پارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

عوارض و مراقبت های پرستاری	دسته دارویی و کاربرد	دوز دارو و نحوه استفاده	نام دارو
<p>سر درد - بی خوابی - گیجی - میدرباز - خشکی دهان - تپش قلب</p>	<p>آنتی کولینرژیک و آنتی آریتمی درمان برادی کاردی علامت دار - قبل از عمل جراحی برای کاهش ترشحات بزاق - درمان مسمومیت با ارگانوفسفرها</p>	<p>0/5 mg /1 ml دوز آتروپین در بالغین ۰/۵ میلی گرم وریدی که در صورت لزوم تا سقف ۲ میلی گرم هر سه تا ۵ دقیقه قابل تکرار می باشد , در اطفال ۰/۰۲ میلی گرم به ازای وزن بدن که حداکثر تا یک میلی گرم هر ۵ دقیقه قابل تکرار می باشد</p>	<p> آتروپین سولفات Atropine Sulfate</p>

• آتروپین آنتی دوت ارگانوفسفرها می باشد

• دوز آتروپین در بزرگسالان نباید کمتر از ۰/۵ میلی گرم و در اطفال نباید کمتر از ۰/۱ میلی گرم باشد چون اثرات معکوس باعث افت بیشتر ضربان قلب ( برادی کاردی پارادوکسیال ) می گردد و می تواند باعث بروز فیبریلاسیون بطنی گردد .

عوارض و مراقبت های پرستاری	دسته دارویی و کاربرد	دوز دارو و نحوه استفاده	نام دارو
<p>سر درد - تپش قلب - تاکیکاردی - تهوع - استفراغ - هایپرتانسیون - هموراژی مغزی - شوک و فیبریلاسیون بطنی</p>	<p>آگونیست گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک احیای قلبی ریوی - شوک انافیلاکسی - واکنش های آلرژیک - برونکواسپاسم ناشی از آسم</p>	<p>در احیا دوز بالغین , ۱ میلی گرم به صورت تزریق داخل وریدی هر ۳ تا ۵ دقیقه و در کودکان ۰.۰۱ تا ۰.۰۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن کودک دوز داخل تراشه اپی نفرین ۲ تا ۲.۵ میلی گرم می باشد</p>	<p> اپی نفرین Epinephrine</p>

• آنتی دوت اپی نفرین در صورت هایپر تانسیون , فتولامین ( آلفا بلوکر ) و در صورت آریتمی ( بتا بلوکر ) می باشد .

• نحوه تهیه اپی نفرین ( با غلظت ۱:۱۰۰۰۰ ) : یک آمپول یک میلی گرمی اپی نفرین + ۹ سی سی آب مقطر