



پارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

عوارض و مراقبت های پرستاری	دسته دارویی و کاربرد	دوز دارو و نحوه استفاده	نام دارو
افت فشار خون، آسیستول و شوک کاردیوژنیک، ضعف، خستگی، سردرد، دیس ریتمی، هایپوتانسیون، نارسایی قلبی بیمار را به دقت از نظر BP و ECG (بلوک) دهلیزی-بطنی، برادی کاردی و افت فشار خون) مانیتور کنید، در صورت مشاهده این عوارض سرعت دارو را کند یا مصرف آن را موقتا قطع نمایید، خطرناکترین عارضه این دارو پنومونی می باشد، بنابراین الگوی تنفسی و علائم مسمومیت ریوی بررسی گردد.	ضد آریتمی بطنی و فوق بطنی پیشگیری و درمان فیبریلاسیون بطنی، تاکی کاردی بطنی همراه با همودینامیک ناپایدار و مقاوم به دفیبریلاتور، درمان کوتاه مدت فیبریلاسیون دهلیزی، ایست قلبی ثانویه به فیبریلاسیون بطنی یا تاکی کاردی بطنی فاقد نبض	150mg/3ml در VF یا VT بدون نبض بعد از شوک سوم بصورت ۳۰۰ میلی گرم بلوس وریدی یا داخل استخوانی و در صورت عدم پاسخ ۱۵۰ میلی گرم دیگر تکرار می گردد، جهت رقیق سازی دارو از محلول دکستروز ۵ درصد استفاده می گردد. 	 آمیودارون Amiodarone

(۱) در سایر موارد ابتدا ۱۵۰ میلی گرم در زمان ۱۰ دقیقه و سپس ۱mg /min برای ۶ ساعت و سپس 0/5mg /min برای ۱۸ ساعت بعنوان دوز نگهدارنده تا سقف 2.2gr در ۲۴ ساعت داده می شود.

(۲) انفوزیون آمیودارون باید از یک رگ اصلی و بزرگ صورت گیرد.

عوارض و مراقبت های پرستاری	دسته دارویی و کاربرد	دوز دارو و نحوه استفاده	نام دارو
شایع ترین عارضه این دارو: تضعیف سیستم عصبی مرکزی می باشد. از عوارض دیگر آن تضعیف عضله قلب (برادیکاردی، هیپوتانسیون) ، گیجی، خواب الودگی، پاراستزی، آرتیتاسیون، تشنج و واکنش های پوستی	ضد آریتمی بطنی، بی حس کننده موضعی لیدوکائین داروی ضد آریتمی برای درمان VT یا VF در بیماران که در خطر عود مجدد این آریتمی ها هستند نظیر مبتلایان به هیپوکالمی، ایسکمی میوکاردا، و یا بدکاری شدید بطن چپ، به صورت انفوزیون تجویز میگردد	دوز بلوس 1mg/kg و در صورت نیاز به تکرار دوز 10 دقیقه بعد از بلوس اول، 0.5mg/kg تزریق شود، می توان هر 3 - 5 دقیقه تکرار کرد، اما مقدار نهایی از 3mg/kg بیشتر نشود، بعد از احیای قلبی با دوز نگهدارنده-2-4mg/kg به مدت 24 ساعت ادامه یابد	 لیدوکائین ۲ درصد Lidocaine 2%

- نوار قلب بیمار را به دقت از نظر بروز آریتمی مانیتور نمایید.
- وضعیت CNS بیمار را بررسی کنید. تغییر ناگهانی در وضعیت بیمار را گزارش کنید.