



بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) سیناب

سوال : منظور از داروهای هشدار بالا چیست ؟

سوال : داروهای پر خطر کدامند ؟

سوال : تفاوت داروهای هشدار بالا و پر خطر چیست ؟

سوال : منظور از داروهای ستاره دار در تالی چیست ؟

سوال : منظور از رنگ های زرد ، قرمز و آبی در برچسب گذاری دارو ها چیست ؟

داروهای با هشدار بالا داروهایی هستند که بروز اشتباه در مصرف آنها با خطر بالایی از آسیب های جدی و حتی مرگ بیماران همراه است .

به منظور کاهش اشتباه داروپزشکی و ارتقا ایمنی بیماران ، برچسب گذاری این داروها باید بصورت زیر انجام گردد :

- الصاق برچسب قرمز بر روی جعبه ، قفسه ، کشو ، سبد و یا هر مخزن نگهداری این داروها در داروخانه ، تالی اورژانس ، اتاق درمان در اورژانس یا سایر بخش های بیمارستان
- نوشته شدن نام دارو به همراه قدرت دارویی با فونت متناسب با اندازه مخزن نگهداری ، با فونت مشکی و زبان فارسی به نحوی که از دور قابل خواندن باشد .
- از بین داروهای با هشدار بالا ، ۱۲ دارو که احتمال خطر بالاتری دارند بعنوان داروهای پر خطر معرفی شده اند (آتروپین ، اپی نفرین ، لیدوکائین ، پروپرانولول ، پیتاسیم کلراید ، سدیم بیکربنات ، منیزیوم سولفات ، کلسیم گلوکونات ، هایپر سالین ، هیپارین ، رتپلاز ، هالوپریدول)

برای این ۱۲ داروی تزریقی، ضروری است علاوه بر رعایت اصول عمومی برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا، بر روی هر آمپول یا ویال برچسب هشدار، الصاق شود.



ضوابط برچسب گذاری ۱۲ قلم دارو :

۱. نحوه برچسب گذاری و اندازه برچسب بر روی این داروها باید به صورتی باشد که مشخصات مندرج بر روی آمپول و یا ویال را نبوشانده و باعث مخدوش و ناخوانا شدن هیچ یک از مندرجات روی فرآورده نشود .
۲. برچسب هشدار داروهای مذکور باید به رنگ قرمز و فاقد هرگونه نوشته از قبیل نام دارو و یا عبارت "داروی با هشدار بالا" و غیره باشد .
۳. برچسب داروها نباید به سهولت از بدنه آمپول یا ویال جدا شود و می بایست قابلیت چسبندگی مطلوبی داشته باشد



بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

توجه: داروهای هشدار بالا و پرخطر باید در زمان چک دستورات، اجرای گزارش پرستاری و زمان تجویز و استفاده، توسط دو پرستار بصورت مجزا چک و اجرا گردد.

داروهای ستاره دار: استفاده از داروهای دارای علامت ستاره * نیازمند استفاده از امکانات مانیتورینگ قلبی است.

برچسب داروهای با اسامی و اشکال مشابه، به رنگ زرد است و باید به نحوی بر روی ویال‌های دارویی الصاق شود که نام و مشخصات

دارو، قابل خواندن باشد.

نادآوری: برچسب داروهای با هشدار بالا، به رنگ قرمز است و باید به نحوی بر روی ویال‌های دارویی، الصاق شود که نام و مشخصات

دارو قابل خواندن باشد.

برخی از داروهای با هشدار بالا که دارای شباهت شکلی یا اسمی نیز هستند را فقط با برچسب دارویی با هشدار بالا و به رنگ قرمز

نشان‌گذاری کنید. در تمامی انبارهای دارویی بیمارستان (مثل انبار بخش، انبار مرکزی بیمارستان و داروخانه)، ظروف نگهداری

داروهای با اسامی و اشکال مشابه را با برچسب زرد رنگ نشان‌گذاری نمایید.

حین برچسب‌گذاری، دقت نمایید که بر روی ظروف نگهدارنده، برچسب صحیح زده شود.

دستورالعمل نگهداری دارو ها در یخچال‌های دارویی

" رنگ آبی برای برچسب‌گذاری داروهای یخچالی استفاده می‌گردد "

۱. یخچال‌های دارویی باید حاوی دماسنج و رطوبت‌سنج بوده و دما و رطوبت یخچالها مطابق دستورالعمل ثبت دما و رطوبت بصورت مرتب ثبت شوند.
۲. محدوده دمایی استاندارد یخچال دارویی ۲-۸ درجه سانتی‌گراد میباشد و باید از یخ زدن داروها جلوگیری شود.



انجمن تشویش و اعتماد سازی دانشجویان

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

۳. دارو هایی که دمای نکه داری آنها ۲ - ۸ درجه سانتی گراد ذکر شده، حتما در یخچال نکه داری شوند.
۴. دارو هایی که دمای آنها ۲ - ۲۵ درجه سانتی گراد و یا زیر ۲۵ درجه سانتی گراد ذکر شده، میتوان در یخچال یا اتاق با دمای کنترل شده نگهداری کرد.
۵. دارو هایی که دمای نکه داری آنها اتاق یا ۲۵ - ۳۰ درجه سانتی گراد ذکر شده، را باید در اتاق با دمای کنترل شده نگهداری کرد.
۶. برخی داروها تا قبل از باز شدن باید در یخچال نکه داری شوند و بعد از باز شدن تا مدت معینی قابل نکه داری در خارج از یخچال میباشد. مثال: انسولین تا ۱ ماه بعد از باز شدن، قطره کلرامفنیکل تا ۲۱ روز بعد از باز شدن.
۷. برخی داروها تا قبل از باز شدن باید در یخچال نکه داری شوند و بعد از باز شدن باید در خارج از یخچال نکه داری شوند، مثال اسپری بینی کلسیتونین حین مصرف تا ۱ ماه.
۸. برخی داروها تا قبل از آماده سازی یا باز شدن در دمای اتاق نکه داری شوند و بعد از آماده سازی یا باز شدن باید در یخچال نکه داری شوند یا در صورت نکه داری در یخچال ماندگاری آنها بیشتر میشود. مثال: آنتی بیوتیک ها، محصولات مایع شرکت یوروویتال شربت زینک پلاس
۹. هنگام تحویل دارو از داروخانه به بخش داروهای یخچالی را در کیسه مخصوص حاوی برچسب داروهای یخچالی قرار داده تا از سایر دارو ها متمایز شوند و سریع انتقال داده شوند.
۱۰. از گذاشتن مواد غذایی در یخچال دارویی جدا خودداری شود.
۱۱. با توجه به اختلاف در نحوه فرمولاسیون دارو ها ملاک اصلی، نحوه نکه داری درج شده در بروشور دارو ها میباشد.



واحد آموزش و سلامت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب