



دانشگاه علوم پزشکی
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

عقرب گزیدگی



شناسنامه پمفلت آموزشی کد: AH-TR-PED-3	
عقرب گزیدگی	عنوان
نیلا مظاهری	تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار	تایید کننده
1402 بازنگری	سال تهیه
یاسر ترابی	ناظر کیفی
دکتر سیمین یزدی	تایید کننده علمی

از تیغ زدن (یا شکافتن محل گزش) . مکیدن
بستن محکم اندام در بالاتر از محل گزش و
سوزاندن محل گزش باید خودداری شود .

به فرد عقرب گزیده مایعات زیاد بدهید و متوجه تغییر
رنگ احتمالی ادرار او باشید و در صورت تغییر رنگ
ادرار حتما به پزشک مراجعه کنید .

اقدامات موثر در پیشگیری از

عقرب گزیدگی :

- نوسازی اماکن و منازل قدیمی
- انتقال نخاله های ساختمانی دور از محل سکونت.
- احتیاط هنگام پوشیدن لباس و کفش
- خوابیدن روی تخت های پایه بلند بجای سطح زمین
- توجه به آجرها و خاک هنگام کار ساختمانی و یا کشاورزی و استفاده از دستکش های ضخیم.
- اطلاع رسانی و آشنایی مردم با مناطق عقرب خیز

منبع : راهنمای اقدامات پیش

بیمارستانی گزش

تشخیص عقرب گزیدگی :

- 1- بر اساس محل زندگی از نظر وجود عقرب (منطقه جغرافیایی)
- 2- فصل سال : نیمه اول سال (بهار و تابستان)
- 3- پیدا کردن عقرب
- 4- علایم عقرب گزیدگی

در موارد زیر حتما به پزشک
مراجعه کنید:

- نوع عقرب : گادیم خطرناکترین است.
- زمان گزش: هرچه به زمان ابتدای شب نزدیک تر باشد که عقرب هنوز سم خود را استفاده نکرده است خطرناک تر است .
- هر چه محل گزش به سر و گردن نزدیک تر باشد .
- مدت زمان گزش تا زمان مراجعه به مرکز درمانی بیشتر باشد خطرناک تر است .
- هرچه سن کمتر باشد با توجه به غلظت سم در بدن خطرناک تر است .

در ایران بخصوص در استانهای جنوبی
و جنوب غربی عقرب به وفور دیده
می شود .

دو گونه بزرگ این عقرب ها :

1- خانواده اسکور پیو ئیده :

کوچک و زرد رنگ و بنام گادیم
شناخته می شود سم آن مرگ آور
است بخصوص در سن زیر 6 سال
به عنوان تهدید کننده حیات محسوب
می شود . دم آن به صورت دانه برنجی
است . محل گزش در ابتدا دردناک نیست .

2- خانواده بوتئیده :

عقرب سیاه نامیده می شود جثه بزرگ دارد
محل گزش آن بسیار دردناک است ولی
به اندازه گادیم خطرناک نیست .

عقرب ها شب زی هستند یعنی روزها در محل
های خنک تر و شکاف دیوارها زیر سنگ ها
لای پوست درختان به سر می برند .
درجات بالای 40 درجه را هم می توانند تحمل
کنند و با شروع شب از مکان امن خود برای
شکار بیرون می آیند . عقرب ها گوشتخوارند
و از کرم ها و حشرات تغذیه می کنند .

علایم :

موضعی (محل گزش) :

درد شدید در عقرب های سیاه

درد مختصر در عقرب های زرد

قرمزی و تاول و سوزش

نکروز (آسیب پوست یا بافت مردگی)

عمومی :

تب و استفراغ و بی قراری و سردرد.

عقرب سیاه سم نورو توکسین دارد و درد

شدید ایجاد می کند .

ابتدا علایم تحریک پارا سمپاتیک شامل:

تنگی نفس . ترشح زیاد بزاق . اشک

ریزش . افزایش ترشح ریه . تعریق

تنگی مردمک . افت فشارخون

در نهایت علایم تحریک سمپاتیک :

خشکی دهان و گشادی مردمک

تپش قلب و افزایش فشار خون تنگی

و نفس و تشنج و کما

عقرب زرد گادیم سم سیتوتوکسین دارد.

می تواند آسیب پوستی (کبودی و زخم)

و نارسایی کلیه در نتیجه تخریب گلبول های

قرمز و ادرار پررنگ (آلبالویی) ایجاد کند .

ولی چون دردناک نیست دیر مراجعه

می کنند و این تاخیر باعث آسیب

سیستم های بدن می شود .